

ПРОТОКОЛ АНЕСТЕЗИИ С ЛАРИНГЕАЛЬНОЙ МАСКОЙ

Дата _____ 20 _____ г. _____ ч. _____ мин. — _____ ч. _____ мин.

Исходно АД _____ / _____ мм.рт. ст. ЧСС _____ в мин.

Премедикация в операционной:

Sol. Phentanyli 0,005% — _____ мл (_____ мг) _____ ампул

р-р атропина 0,1% _____ мл, _____ мг,

Вводный наркоз:

Пропофол _____ мг

Введена ларингеальная маска № _____ (без особенностей)

Наркозно-дыхательный аппарат _____

Ингаляционная анестезия: FiO₂ _____ %, ПСГ _____ л/мин, севоран _____ об. % (_____ мл)

Sol. Phentanyli 0,005% — _____ мл (_____ мг) _____ ампул

пропофол _____ мг _____

Течение анестезии _____

ИВЛ _____ ДО _____ МОД _____

Гемодинамика _____

АД _____ / _____ мм.рт. ст. ЧСС _____ в мин

В/в введено дробно: _____

В/в капельно введено: р-р NaCl 0,9% _____ мл; р-р Рингера _____ мл; р-р Глюкозы 5% _____ мл; _____

По окончании операции, восстановлении сознания ларингеальная маска удалена,

больной (ая) переводится в палату под наблюдение дежурного врача.

АД _____ / _____ мм.рт. ст. ЧСС _____ в мин. ЧД _____

врач анестезиолог-реаниматолог _____

мед. сестра-анестезист _____