

**ПРОТОКОЛ ВНУТРИВЕННОЙ СЕДАЦИИ**

Дата \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин. \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

Исходно АД \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ мм.рт.ст. ЧСС \_\_\_\_\_ в 1 мин

в/в: пропофол \_\_\_\_\_ мг  
\_\_\_\_\_Течение седации  
\_\_\_\_\_Дыхание спонтанное + O<sub>2</sub> через маску / носовые катетеры

Ингаляция севофлурана через маску наркозного аппарата \_\_\_\_\_ об.% (\_\_\_\_\_ мл)

Гемодинамика в течение седации (стабильная / нестабильная)  
\_\_\_\_\_

АД \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ мм.рт.ст. ЧСС \_\_\_\_\_ в мин

в/в дробно: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_В/в капельно: р-р NaCl 0,9% \_\_\_\_\_ мл; р-р Рингера \_\_\_\_\_ мл; р-р Глюкозы  
5% \_\_\_\_\_ мл; НАЕС 6% \_\_\_\_\_ мл; \_\_\_\_\_

Пробуждение своевременное / замедленное

Больной(ая) в сознании переводится в палату под наблюдение лечащего (дежурного)  
врача

АД \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ мм.рт.ст. ЧСС \_\_\_\_\_ в мин. ЧД \_\_\_\_\_

врач анестезиолог-реаниматолог \_\_\_\_\_

мед. сестра-анестезист \_\_\_\_\_