

**ПРОТОКОЛ МАСОЧНОЙ АНЕСТЕЗИИ**

Дата \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ мин. — \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ мин.

Исходно АД \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ мм рт.ст. ЧСС \_\_\_\_\_ в мин.

Премедикация в операционной: р-р атропина 0,1% \_\_\_\_\_ мл р-р тавегила \_\_\_\_\_ мл

в/в Индукция: Пропофол \_\_\_\_\_ мг \_\_\_\_\_

Sol. Phentanyli 0,005% — \_\_\_\_\_ мл ( \_\_\_\_\_ мг)

Ингаляционная индукция: севофлуран \_\_\_\_\_ об% через маску наркозно-дыхательного аппарата

Поддержание анестезии: севофлуран \_\_\_\_\_ об% через маску наркозно-дыхательного аппарата

Расход севофлурана \_\_\_\_\_ мл

Течение анестезии \_\_\_\_\_

Дыхание спонтанное, адекватное

Гемодинамика \_\_\_\_\_

АД \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ мм рт.ст. ЧСС \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ в мин

В/в дробно: \_\_\_\_\_

В/в капельно: р-р NaCl 0,9% \_\_\_\_\_ мл; р-р Рингера \_\_\_\_\_ мл; р-р Глюкозы 5% \_\_\_\_\_ мл; НАЕС 6% \_\_\_\_\_ мл; \_\_\_\_\_

Пробуждение своевременное / замедленное.

Больной(ая) в сознании переводится в палату под наблюдение лечащего (дежурного) врача.

АД \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ мм рт.ст. ЧСС \_\_\_\_\_ в мин. ЧД \_\_\_\_\_

врач анестезиолог-реаниматолог \_\_\_\_\_

мед. сестра-анестезист \_\_\_\_\_