



Применение Даларгина для коррекции эндотелиальной дисфункции


**Гребенчиков О.А., Лихванцев В.В.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
ФНКЦ РР «НИИ Общей реаниматологии им.
В.А. Неговского» ФАНО**

ЭНДОГЕННАЯ ОПИОИДНАЯ СИСТЕМА


- 1973 г. – открытие опиоидных рецепторов
- 1975 г. – Дж. Хьюз и Г. Костерлиц. Открытие эндогенных лигандов опиоидных рецепторов – энкефалинов
- На сегодняшний день открыто более 30 эндогенных лигандов опиоидных рецепторов
- Синтезировано более тысячи их аналогов

ДАЛАРГИН

- Даларгин, синтезирован в 1983 году в лаборатории синтеза пептидов ВКНЦ АМН СССР (проф. М.И.Титов)
- Даларгин (тирозил-Д-аланил-глицил-фенилаланил-лейциларгинина диацетат) — энзимостойчивый аналог эндогенного лейэнкефалина, эффекты которого реализуются во взаимодействии с периферическими m - и δ -ОР практически в равной степени
- Первое применения в клинической практике даларгина как средства лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Смагин В.Г., Виноградов В.А., Булгаков С.А., 1987, Тер. архив., № 2, С.44-48



Противоязвенное действие различных доз даларгина



БЮЛЛЕТЕНЬ
Всесоюзного кардиологического
научного центра АМН СССР

2

Г. М. Н. С.

МОСКВА - МЕДИЦИНА

М. И. Титов, В. А. Виноградов, Ж. Д. Беспалова

**ДАЛАРГИН — ПЕПТИДНЫЙ ПРЕПАРАТ
С ЦИТОПРОТЕКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ**

Лаборатория синтеза пептидов Института экспериментальной кардиологии ВКНИИ АМН СССР

ДАЛАРГИН

Впервые применен в анестезиологии в 1987 г. в Институте хирургии им. А.В. Вишневского

Шлозников Б.М., В.В. Лихванцев, Кузнецов А.Ю. Даларгин – основное средство интраоперационной защиты больного при коррекции дефекта межпредсердной перегородки в условиях искусственного кровообращения: новый метод анестезии // Анест. и реаниматол. – 1989. № 4 С. 21-25)

Даларгин обладает пульмонопротекторными свойствами, позволившие существенно улучшить вентиляционно-перфузионные соотношения в раннем постперфузионном и послеоперационном периодах

Клинико-экспериментальное обоснование применения даларгина для профилактики нарушений транскапиллярного обмена жидкости в легких в раннем послеоперационном периоде.

Казеннов В.В., 1992, диссертация канд. мед. наук.

Экспериментальные исследования, доказывающие органопротекторные свойства ДАЛАРГИНА

- Антиоксидантное действие даларгина на печень в условиях острого холестаза в эксперименте. Короткина Р.Н., Фомченков Е.П., Бабкина Н.В., 1990, Пат. физиол. и exper. терап. №4, С. 42-44
- Противоишемическое действие нового отечественного препарата даларгина. Соколов Г.Е., Слепушкин В.Д., Савицкий Г.Г., 1989, Воен. мед. журнал №6, С. 20-22.
- Изучение антиноцицептивных свойств даларгина в качестве средства анестезиологической защиты. Шлозников Б.М., Дониц С.Г., Гребенчиков О.А., 1990, Бюлл. exper. биологии и мед., № 3, С. 272-274

Исследования, доказывающие органопротекторные свойства ДАЛАРГИНА

Изучение активности ксантиноксидазы в ткани головного мозга на фоне миоплегии. *Короткина Р.Н., Шлозников Б.М., Дониц С.Г., Гребенчиков О.А., 1990, Бюлл. exper. биологии и мед., № 2, С. 145-146*

- Профилактика инфекционных осложнений Даларгином у кардиохирургических больных. *Журнал Хирургия, 1993 г. Пашутин С.Б. и соавт.*
- Динамика осложнений в раннем послеоперационном периоде у гастроэнтерологических больных в 1994-1998 г-х. Роль оптимизации анестезиологического обеспечения. *Вестник интенсивной терапии, 1999 г. Оноприев В.И., Заболоцких И.Б. и соавт.*

Даларгин и инфекционные осложнения в абдоминальной хирургии


5218 пациентов, оперированных в течении 5 лет в Краснодарском центре хирургической гастроэнтерологии.

Ретроспективное исследование. Группа – комбинированная общая анестезия (КОА), группа КОА + Даларгин (10-20 мкг/кг/час).

Общее количество инфекционных осложнений 7,2% в группе КОА и 2,0 % КОА + Даларгин, $p=0,001$

Динамика осложнений в раннем послеоперационном периоде у гастроэнтерологических больных в 1994-1998 г-х. Роль оптимизации анестезиологического обеспечения. *Вестник интенсивной терапии, 5-6 1999*
Оноприев В.И., Заболотских И.Б. и соавт.

Ишемическое прекондиционирование.



Murry et al. Circulation 1986

Преко́ндиционирование –

Это термин, который используется для характеристики толерантности клетки к воздействию повреждающего фактора в результате предварительного влияния стрессорных стимулов.


Murry C. E.

Circulation 1986

Открыт эффект морфина на уменьшение зоны инфаркта при окклюзии левой коронарной артерии, сопоставимый с эффектом ишемического преко́ндиционирования, и отмена этого эффекта неселективным антагонистом дельта-опиоидных рецепторов налтриндолом, причем эффект ишемического преко́ндиционирования также отменялся.

[Schultz JJ, Hsu AK, Gross G]. Ischemic preconditioning and morphine-induced cardioprotection involve the delta (δ)-opioid receptor in the intact rat heart. J Mol Cell Cardiol 1997]


Молекулярные механизмы ишемического preconditionирования




M. Juhazova, D. B. Zorov, Suh-Hee Kim.

Glycogen synthase-3 β mediates convergence of protection signaling to inhibit the mitochondrial permeability transition pore. *J Clin Invest* V 113 N 11 June 2004


Механизмы фармакологического preconditionирования








1




2

Эффекты LiCl и даларгина на фосфорилирование GSK-3 β

A




Конт LiCl ДА
60мг 50мкг



Конт ДА ДА
25 мкг 50 мкг

B



Конт LiCl ДА
60мг 50мкг




Конт ДА ДА
25 мкг 50 мкг

Inflammation

Phosphorylation

Inactivation



Monocyte

↓40-60%

Expression

↓60%

Adhesion


Transmigration


↓85%

BBB

Rom S, Fan S, Reichenbach N, Dykstra H, Ramirez SH, Persidsky Y. Glycogen synthase kinase 3 β inhibition prevents monocyte migration across brain endothelial cells via Rac1-GTPase suppression and down-regulation of active integrin conformation. *Am J Pathol.* 2012 Oct;181(4):1414-25.

Механизм адгезии лейкоцитов к эндотелию и ICAM1





GSK3 β and the control of infectious bacterial diseases

Huizhi Wang, Akhilesh Kumar, Richard J. Lamont, and David A. Scott

Даларгин и инфекционные осложнения в абдоминальной хирургии

5218 пациентов, оперированных в течении 5 лет в Краснодарском центре хирургической гастроэнтерологии.

Ретроспективное исследование. Группа – комбинированная общая анестезия (КОА), группа КОА + Даларгин (10-20 мкг/кг/час).


Общее количество инфекционных осложнений 7,2% в группе КОА и 2,0 % КОА + Даларгин, $p=0,001$

Динамика осложнений в раннем послеоперационном периоде у гастроэнтерологических больных в 1994-1998 г-х. Роль оптимизации анестезиологического обеспечения. *Вестник интенсивной терапии, 5-6 1999*
Оноприев В.И., Заболотских И.Б. и соавт.

ЭНДОТЕЛИЙ И СЫВОРОТКА КРОВИ СЕПТИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

- Эндотелиальные межклеточные контакты выполняют важнейшую роль в поддержании целостности сосудов
- Повышение проницаемости эндотелия при действии ФНО обеспечивается за счет реакций фосфорилирования и убиквитинилирования VE-кадгерина (Основного компонента адгезивных межклеточных контактов)


АДГЕЗИОННЫЕ ПРОЧНЫЕ КОНТАКТЫ КЛЕТОК ЭНДОТЕЛИЯ



Актин

VE-кадгерин

Ядра



Контроль

Септическая сыворотка



Септическая сыворотка +
Даларгин (1 мкг\мл)

Септическая сыворотка +
Даларгин (10 мкг\мл)


Септическая сыворотка +
Даларгин (50 мкг\мл)

Септическая сыворотка +
Даларгин (100 мкг\мл)


Больной
Н., 27 лет,
септическ
ий шок





B




G







B




Г






Относит. Фосфор-GSK3β, %

Септическая сыворотка



Относит. Фосфор-GSK3β, %

Даларгин 50 мкг\мл




Относит. Фосфор-GSK3β, %







Септическая сыворотка + 50 Даларгин









септическая сыворотка + даларгин



Ось абсцисс, FITC



pGSK Ось абсцисс, FITC





ГЛАВНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС

Спасибо за внимание!